

Comment votre vétérinaire PEUT-IL DIAGNOSTIQUER L'ÉPILEPSIE DE VOTRE CHIEN ?

La majorité des chiens épileptiques souffrent d'épilepsie primaire³. À tout autre point de vue, ces chiens sont en parfaite santé.

L'épilepsie peut survenir chez tous les chiens et à tout âge, mais elle est plus souvent observée chez les jeunes chiens de race. La plupart des chiens font leur première crise **entre 1 et 5 ans**².

Il est possible que votre vétérinaire puisse déjà établir le diagnostic d'épilepsie sur base de l'historique médical de l'animal, d'un examen clinique ou d'un bilan sanguin de base. Dans certains cas, votre vétérinaire vous conseillera **des examens complémentaires** afin de confirmer le diagnostic.

Traitement de l'épilepsie

Chaque chien est unique, et le type ainsi que la sévérité de l'épilepsie peuvent différer d'un chien à l'autre. Votre vétérinaire peut vous expliquer comment gérer au mieux cette affection. En cas de traitement, les points suivants sont très importants :

- Administrez le traitement **quotidiennement** et à **des heures régulières**.
- **N'arrêtez jamais le traitement** sans l'avis de votre vétérinaire.
- Faites **régulièrement contrôler** l'état de santé de votre chien, afin que votre vétérinaire puisse adapter le traitement si nécessaire.



L'épilepsie ne doit pas s'interposer entre VOUS ET VOTRE CHIEN

Il existe 1000 bonnes raisons d'aimer un chien. **Aucune d'entre elles ne mérite d'être négligée à cause de l'épilepsie !** Grâce au traitement adéquat, vous permettrez à votre chien d'être à nouveau heureux et vous profiterez pleinement de son agréable compagnie.



Raison 125: il se mêle de tout.

Renseignez-vous sur l'épilepsie en visitant le site www.epilepsie-chien.be ou parlez-en à votre vétérinaire.

Références:

1. Berendt M. Epilepsy. In: Braund KG, ed. *Clinical Neurology In Small Animals—Localization, Diagnosis, and Treatment*. Ithaca, NY: International Veterinary Information Service; 2004.
2. Podell M. Seizures. In: Birchard SJ, Sherding RG, eds. *Saunders Manual of Small Animal Practice*, 3rd ed. St. Louis, MO: Saunders/Elsevier; 2006:1277–1293.
3. Thomas W. Seizures and narcolepsy. In: Dewey CW, ed. *A Practical Guide to Canine and Feline Neurology*. Ames, IA: Wiley-Blackwell; 2008:237–255.



APPRENEZ À GÉRER L'ÉPILEPSIE DE VOTRE CHIEN

et profitez d'une agréable
vie ensemble



Raison 75: je n'ai pas besoin de réveil-matin.

Il existe 1000 bonnes raisons
d'aimer un chien.

**Aucune d'entre elles ne mérite
d'être négligée !**

Une publication de



En savoir plus sur l'épilepsie vous permet d'**ENVISAGER L'AVENIR AVEC CONFIANCE**

Chez le chien comme chez l'homme, l'épilepsie est relativement fréquente : elle peut toucher jusqu'à 5 chiens sur 100¹. Fort heureusement, il existe d'excellents traitements.

On ne parle d'épilepsie qu'en cas de crises répétées. Les crises sont la conséquence d'impulsions électriques excessives au niveau du cerveau².



L'épilepsie peut globalement être divisée en 2 types :

Épilepsie primaire

Aucune cause sous-jacente aux crises ne peut être identifiée.

Épilepsie secondaire

D'autres problèmes médicaux sont à l'origine des crises, comme par exemple une infection, une tumeur, un traumatisme crânien ou un empoisonnement.

Les crises épileptiques se présentent sous différentes formes. Dans des cas modérés, on observera uniquement un léger frémissement de la lèvre du chien. Lors de crises intenses, le chien peut tomber au sol et faire des mouvements sauvages de pédalage avec ses pattes. Après la première crise de votre chien, des semaines, voire des mois peuvent s'écouler avant qu'une nouvelle crise ne se déclenche. Dans certains cas, votre chien n'aura plus jamais de crise.

L'épilepsie est une maladie qui dure généralement toute la vie du chien. Ne vous découragez pas ! En collaborant avec votre vétérinaire, vous pouvez contrôler les crises et profiter pleinement de l'amitié de votre chien.

Sachez à quoi vous attendre **AVANT, PENDANT ET APRÈS** une crise

Bien que les crises soient toutes différentes, une crise se décompose habituellement en 3 phases :

► PHASE 1

Modifications du comportement de votre chien avant la crise

Avant une crise, vous pouvez observer certains changements chez votre chien :

- **Mouvements** : déambulation ou léchage des babines
- **Fonctions corporelles** : saliver ou uriner
- **Humeur** : pleurs, aboiements ou isolement (agitation)

► PHASE 2

La crise

Souvent, les crises commencent par un raidissement des muscles. Votre chien peut ensuite tomber au sol sur le flanc, avec les membres tendus et la tête basculée en arrière. Il peut commencer à faire des mouvements de pédalage avec ses membres. La majorité des chiens respirent également plus vite et plus fort, et ils peuvent aussi vocaliser, uriner et/ou déféquer.

► PHASE 3

Changements chez votre chien après la crise

Une fois la phase convulsive terminée, votre chien peut rester couché au sol un moment sans bouger avant d'essayer de se relever. La plupart des chiens montrent également des changements de comportement inhabituels; ces changements peuvent durer de plusieurs minutes à plusieurs jours et inclure :

- Désorientation et démarche chancelante
- Faim et soif excessives
- Activité intestinale et/ou urinaire incontrôlée(s)

SOYEZ BIEN PRÉPARÉ : sachez que faire si votre chien fait une crise

L'épilepsie primaire étant incurable, votre chien pourra toujours faire une crise occasionnelle même s'il est sous traitement antiépileptique. Le plus important est de rester calme et de suivre ces quelques conseils pour vous aider à sécuriser l'environnement de votre chien pendant la crise. Après la crise, n'hésitez pas à prendre contact avec votre vétérinaire si nécessaire.

Protégez votre chien des blessures qu'il pourrait se faire.

Enlevez tous les objets contre lesquels votre chien pourrait se cogner (les tables ou les chaises, ainsi que les fils électriques dans lesquels il pourrait s'emmêler). N'essayez JAMAIS de tenir la tête de votre chien ou de sortir la langue de sa gueule. Les chiens n'avalent pas leur langue mais risquent de vous mordre accidentellement car leurs mouvements, pendant les crises, sont involontaires.

Limitez les « stimuli sensoriels ».

Créez un environnement sombre et calme : éteignez la télévision, fermez les rideaux, baissez les lumières et, si possible, faites sortir les autres animaux et les enfants de la pièce.

Chronométrez la crise.

Une crise ne dure généralement que quelques secondes, voire quelques minutes. Appelez immédiatement votre vétérinaire si :

- la crise de votre chien dure plus de 5 minutes.
- votre chien fait plusieurs crises dans la même journée.

Tenez un journal des crises et enregistrez une vidéo.

En tenant un journal des crises et en enregistrant une vidéo, vous fournirez à votre vétérinaire des informations utiles lors de votre prochaine visite. Grâce à ces informations, il pourra préconiser le traitement le mieux adapté au cas de votre chien.